



# 农作物病虫害情报

舟山市农业技术推广中心  
地址：舟山市新城临长路 195 号  
电话：（0580）8176740

2022 年第 7 期  
粮油第 7 期  
2022 年 7 月 15 日

## 五（3）代稻飞虱发生及防控意见

### 一、发生情况

灯下监测：稻飞虱整体迁入量少，迁入峰不显著，以白背飞虱为主。截止7月10日，小沙、马岙、岑港灯下虫量共累计595只（去年1634只）。7月7日，小沙灯下出现虫峰18只；7月10日，马岙灯下出现虫峰30只。

田间调查：7月12-13日，定海马岙、岑港等地调查，早稻田平均百丛虫量76（幅度0-420只），百丛卵量31粒（幅度0-230粒）；单晚田平均百丛虫量89（幅度0-390只），百丛卵量69粒（幅度0-340粒）。7月11日，普陀展茅、六横调查，平均百丛虫量257（幅度25-990只），百丛卵量233粒（幅度0-540粒）。

### 二、防治意见

**1. 防治策略。**当前晴热高温天气将抑制稻飞虱的发生，但各地仍需加强监测，对达到防治指标的田块，做到应防尽防（稻飞虱防治指标：早稻田 500 头/百丛，单晚田 200 头/百丛）。

**2. 防治时间。**7月20-22日（6小时内遇雨应重新喷药防治），5-7天后检查防效，视情再补治一次。

**3. 防治药剂。**每亩可选用25%吡蚜酮可湿性粉剂30克或80%烯啶·吡蚜酮水分散粒剂10克。以上药剂每亩兑水45公斤喷雾；施药应避免高温时段；田间要保持3-4厘米水层。

注意做好农药废弃包装物和废旧农膜回收。

调查、预报：王明、徐晨光

签发：夏卓盛